

Einnahme von „verkleppter“ homöopathischer Arznei



Gruppenbührener Str. 7
27777 Ganderkesee

Tel: 04222 / 3760
Fax: 04222 / 6797
www.praxis-ganderkesee.de
info@praxis-ganderkesee.de

Dr. med. Stefan Heimann
Facharzt für Innere Medizin
Palliativmedizin
Rettenungsmedizin
Ernährungsmedizin

Udo Baramsky
Facharzt für Allgemeinmedizin
Palliativmedizin, Chirotherapie
Rettenungsmedizin
ärztliche Osteopathie (DAAO)

Dr. med. Jörg Albrecht
Facharzt für Allgemeinmedizin
Homöopathie, Chirotherapie
Naturheilverfahren
Rettenungsmedizin

Dr. med. Daniela Albrecht
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Homöopathie
Manuelle Medizin
Rettenungsmedizin

Anja Kaebler (angestellt)
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Akademische Lehrpraxis
der Medizinischen
Hochschule Hannover
Hospitationspraxis
der European Medical
School Oldenburg

Nur Terminsprechstunde
Unsere Anmeldung ist zu folgenden
Zeiten besetzt:
Mo - Fr 7:30 – 12:00 Uhr

Mo, Di & Do 14:30 – 18:00 Uhr
Fr 12:45 – 14:30 Uhr

Bankverbindung
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
(APO-Bank)

IBAN: DE64 3006 0601 0007 7833 53

BIC: DAAED EDD



Es gibt verschiedene Einnahmemethoden von homöopathischen Medikamenten. Sie wird je nach Situation und Erkrankung individuell angepasst.

Beide unten beschriebenen Methoden sind gleichwertig. Sie können wählen, welche Ihnen mehr entgegenkommt.

Das so genannte „Verkleppern“ geschieht folgendermaßen:

Methode mit Plastikflasche

1. Eine leere Mineralwasserplastikflasche mit Leitungswasser ausspülen, danach ca. zur Hälfte mit kaltem Leitungs- oder Volvic- (o.ä.) Wasser füllen.
2. Hierin ca. 3 Globuli (Kügelchen) geben und auflösen lassen.
3. Flasche ca. 10 x kräftig schütteln
4. Hiervon 1 kleinen Schluck in den Mund nehmen, ca. 30 Sekunden im Mund belassen und dann schlucken.
5. Bei der nächsten Einnahme wieder mit Punkt 3 beginnen, also vor der nächsten Einnahme wieder kräftig verschütteln. Häufigkeit der Einnahme nach Rücksprache.
Wenn wir das Beenden der Einnahme vereinbart haben, Plastikflasche ausgießen und entsorgen – nicht erneut (z.B. bei anderer Erkrankung) verwenden.

oder Sie wählen stattdessen die folgende Methode ...

Methode mit Plastikbecher

1. Ca. 3 Globuli (Kügelchen) in einen ca. dreiviertel mit kaltem Leitungs- oder Volvic- (o.ä.) Wasser gefüllten Plastikbecher geben und auflösen lassen.
2. Dann mit einem Plastiklöffel kräftig ca. 40-50 Mal kräftig verrühren.
3. Hiervon **1 kleinen Schluck** (nicht das ganze Glas, der Inhalt des Glases reicht für mindestens 10 Schlucke) in den Mund nehmen, ca. 30 Sekunden im Mund belassen und dann schlucken.
4. Wenn wir nur 1 Einnahme vereinbart haben (meist bei der Behandlung chronischer Erkrankungen): weiter mit Punkt 5.

Wenn wir mehr als 1 Einnahme vereinbart haben: wieder mit Punkt 2 beginnen,
also vor der nächsten Einnahme wieder kräftig verrühren. Häufigkeit der Einnahme nach Rücksprache.

5. Wenn wir das Beenden der Einnahme vereinbart haben, Plastikbecher ausgießen und zusammen mit Plastiklöffel entsorgen – nicht erneut (z.B. bei anderer Erkrankung) verwenden.